

## دراسة تأثير حمض الريتونك ومقارنته بالكابتسول-١٧-بروبونات في علاج الحزاز المنبسط الفمى

خلط من الكابتسول وحمض الريتونك مع إضافة معجون لزج عليها. مجموعة (ج) تعالج بوضع حمض الريتونك على الآفة بعد إضافة معجون لزج. وتم ترقيم كل مريض وإعطائه زجاجة تحتوى على علاجه ومتابعته إكلينيكيا كل ٥ أيام لمدة ٣٠ يوم وتدوين كل الملحوظات والتئام الآفة ودرجة الألم حسب المقاييس الإكلينيكية.

وقد أثبتت النتائج أن أفضل أسرع علاج (خلال ١٠ أيام) تم بفضل مجموعة (ب) (خلط الكابتسول وحمض الريتونك)، كما اثبتت العلاج بحمض الريتونك فاعليته وهذا يعطينا فرصة لاستخدامه في الحالات التي تتعارض مع العلاج بالكورتيزون وعلى هذا يفضل استخدام خليط الدهانين الكابتسول وحمض الريتونك بعد إذابة المادة اللازجة في علاج حالات الحزاز المنبسط الفمى المتقيح.

الأمراض الفموية القيحية المزمنة قابلة للنكسخصوصا في حال الفشل في علاجها وقد يؤدي ذلك إلى ردود فعل عكسية ومؤلمة، قد تؤثر على الوظائف اليومية للمرضى مثل الأكل والكلام، ولذلك كان علاج هذه الأمراض يعتبر من أهم اهتمامات أخصائي طب الفم.

الحزاز المنبسط المتقيح هو مرض مزمن يصيب الأغشية المخاطية والجلدية ومتصل باضطرابات الجهاز المناعي.

أجريت هذه الدراسة كمحاولة جديدة لعلاج الحزاز المنبسط باستخدام الكابتسول وحمض الريتونك الموضعي على آفة المتقيحة، وتمت الدراسة على ٤٥ مريضا انقسموا إلى ثلاث مجموعات مجموعة (أ) تعالج بوضع الكابتسول-١٧-بروبونات بعد إضافة معجون لزج لثبيت المادة العاجية على آفة الحزاز المنبسط ويكون تأثيرها مباشر عليها. المجموعة (ب) تعالج بوضع